MIKTIONSPROTOKOLL

menge in ml Lott · Hülskamp · Berwig · Real

Protokoll: ohne Medikation mit Medikation

Lott·Hülskamp·Berwig·Real
Überörtliche urologische Gemeinschaftspraxis

Uhr- zeit	1. Tag						2. Tag						3. Tag					4. Tag					
	Trink- menge	Harn- menge	Harn- drang	Urin- verlust	Vorlagen- Wechsel	Uhr- zeit	Trink- menge	Harn- menge	Harn- drang	Urin- verlust	Vorlagen- Wechsel	Uhr- zeit	Trink- menge	Harn- menge	Harn- drang	Urin- verlust	Vorlagen- Wechsel	Uhr- zeit	Trink- menge	Harn- menge	Harn- drang	Urin- verlust	Vorlage: Wechse
*) = esamt-																•					•		

Trinkmenge: in ml (Gläser/Tassen ca. 150 ml) · **Harnmenge:** in ml (Meßbecher) · **Harndrang:** x = kaum, xx = stark, xxx = sehr stark **Urinverlust:** x = Tropfen, xx = feucht, xxx = sehr nass · **Vorlagen**: Angabe in Anzahl

Kontinenz-Fragebogen
der Deutschen Kontinenz Gesellschaft
Wie oft kommt es bei Ihnen zu unwillkürlichem Urinverlust?
 Nie □ Einmal pro Woche oder seltener □ Zwei- bis dreimal pro Woche □ Einmal täglich □ Mehrmals täglich □ Ständig
Wie hoch ist der Urinverlust?
☐ Kein Urinverlust☐ Eine geringe Menge☐ Eine mittelgroße Menge☐ Eine große Menge
Wie stark ist Ihr Leben durch den Urinverlust beeinträchtigt?
0 1 2 3 4
gar nicht stark
Wann kommt es zu Urinverlust?
 Zu keiner Zeit Bevor Sie die Toilette erreichen können Beim Husten, Niesen, Laufen usw. Im Schlaf Bei körperlicher Anstrengung und Sport Nach dem Wasserlassen

Aus keinem ersichtlichen Grund

☐ Urinverlust tritt ständig auf

2 Hauptursachen

1. Harnbelastungsinkontinenz

können.

und Geburten vor.

gut behandeln.

erfolgreiche Therapie leisten.

2. Harndranginkontinenz

Unkontrollierter Urinverlust ist das Zeichen der Harn-

inkontinenz. Man unterscheidet zwei Hauptursachen,

Infolge einer Schwäche des Blasenschließmuskels geht

auch beim Niesen, Husten oder Lachen ab. Diese Form

Urin unkontrolliert bei körperlichen Belastungen wie

Heben, Tragen, Bewegungen oder beim Sport, aber

der Inkontinenz kommt vor allem bei Frauen infolge Schwächung der Muskulatur nach Schwangerschaften

Durch ein aktives Beckenbodentraining, Elektrothera-

pieverfahren, Medikamente oder auch eine operative Unterstützung des Schließmuskels kann die Belastungs-

Kommt es infolge eines ständigen Harndranges zu häu-

figem Wasserlassen oder gar zum dranghaften Urinverlust, liegt die Störung in der Blase selbst und nicht im

Schließmuskel. Diese Blasenstörung, die typisch für

Tumore oder neurologische Erkrankungen hervorge-

rufen werden. Durch ein Blasentraining, mit die Blase dämpfenden Medikamenten und verschiedenen Elektro-

therapieverfahren lässt sich die überaktive Blase sehr

Da das Führen eines Blasentagebuches eine wichtige

Voraussetzung zur Differenzierung zwischen diesen Inkontinenzformen ist, können Sie damit einen wichtigen Beitrag für eine richtige Diagnosestellung und damit

das höhere Alter ist, kann durch eine Überaktivität des

Blasenmuskels, aber auch durch Blasenentzündungen,

inkontinenz erfolgreich behandelt werden.

die auch zusammen als Mischinkontinenz auftreten



MÜSSEN WOLLEN KÖNNEN

Tipps zu Lebensgewohnheiten

(Toilettentraining)

So trainieren Sie Ihre Blase

Dem ersten Drang nicht nachgeben, zögern Sie das Wasserlassen hinaus. Setzen Sie sich hin und warten Sie ab bis der Harndrang nachläßt. Erst dann sollten Sie die Toilette aufsuchen.

Führen Sie zu Beginn und auch im Behandlungsverlauf ein "Toiletten- und Trinkprotokoll": Registrieren und erleben Sie wie Ihr Medikament Ihnen mehr und mehr hilft.

Um zusätzlich den Schließmechanismus Ihrer Harnröhre zu stärken, empfiehlt sich ein Beckenboden-Training.

Geben Sie Ihrem Arzt frühzeitig Rückmeldung über den Erfolg.

So trainieren Sie Ihren Schließmuskel Tipps für den Alltag:

Auch wenn es widersinnig klingt: Ausreichend viel trinken hilft (ca. 21 am Tag)! Wer zu wenig trinkt hat einen konzentrierten Urin, der den Blasenmuskel reizt.

Ernähren Sie sich ausgewogen und ballaststoffreich (z.B. durch viel Gemüse und Vollkornprodukte): Das ist gesund und hilft Verstopfungen vorzubeugen.

So trainiaran Sia Ihran Schliaßmuskal